



Children's Urology Group, PL

**DR. HOMSY
CIRCUMCISION**

EL CUIDADO DE SU HIJO POSTOPERATORIO

MIENTRAS TODAVIA ESTA EN EL HOSPITAL

1. Después de la cirugía que su hijo este completamente despierto sera animado a beber líquidos claros.
2. El sera dado de alta del hospital para la casa cuando este tolerando los fluidos sin vomitarlos. Náusea y vómitos son reacciones comunes después de la anestesia.
3. No se preocupe si ve una poca mancha de sangre en la gasa o la punta del pene.

DESPUES DE LA LLEGADA A CASA

VENDAJE/GASA

1. Su hijo podra tener un pedazo de gasa sobre su abdomen inferior y pene. Deseche la gasa después que sea mojada con orín y **no la** reponga. Aplique cantidades generosas de unguento Neosporin/Bacitracin/ antibiotico 3-4 veces por día sin tocar el pene.
2. El pene se vera hinchado y rojo con algunas areas crudas como tambien algunas manchas de sangre. Esto a de esperarse.

SANGRANDO

1. Si hay sangramiento persistente aplique compression al area apretando el pene con una gasa con el dedo pulgar y el dedo índice por cuatro minutos. Si esto no detiene el sangrar, llame a el médico, atravez de la oficina.

BAÑÁNDOSE

1. Bañe a su hijo 4 veces por día el primer día después de la cirugía. Use agua tibia **sin jabon**. Aplique una cantidad generosa de unguento antibiotico al pene después de cada baño. Simplemente cubre el pene con este unguento. Al poner no frote.
2. Baño regular puede empezar después de dos días a menos indicado por el médico.

DIETA

1. Le puedes dar de comer a su niño jugos, gelatinas y caldos claros por el primer día/tardepostoperatorio. Usted gradualmente puede comenzarle comida solidas regular esa tarde.
2. Una dieta regular puede ser empezada la siguiente mañana.

MEDICACIONES

1. Usted puede darle a su hijo Tylenol (acetaminophen) para cualquier dolor o incomodidad.
2. Para dolor severo su médico puede haberle prescrito Tylenol con codeína.

ACTIVIDADES

1. Sillas de coche infante/niño con correa de seguridad en el sitio, cochecito y sillas elevadas pueden ser usada inmediatamente.
2. Su niño puede pasear en el coche, caminar lo que pueda tolerara y subir y bajar escalones.

3. **EVITE** juguetes como (rebotadores, bicicletas, triciclos y caballos mecedores) por 2 semanas.
4. **EVITE** actividades energicas incluyendo pero no limitado a deportes, correr, brincar, lucha libre y nadar por 2 semanas.
5. Mantenga su niño fuera de la escuela por 1 semana.

PAÑALES (si su niño esta actualmente en pañales)

1. Cambie el pañal de su niño mas frecuentemente por la primera semana postoperatorio.

FIEBRE

1. Si su niño tiene una temperatura por debajo de 102F dele Tylenol como indicado.
2. Para una temperatura de 102F o mas alta dele Tylenol y notifique su médico.

VISITA A LA OFICINA POSTOPERATORIO

1. Por favor haga una cita postoperatorio 2 semanas despues de la fecha de la cirugía (a menos sea indicado de otra manera por su médico) llamando a la oficina mas cercana durante las horas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.

St. Petersburg: 727-456-1055

Tampa: 813-874-7500

Para conseguir el médico despues del horario regular o fines de samana el contestado de servicios te indicara atraves de los números de telefonos anteriormente mencionados arriba.