



Children's Urology Group, PL

CIRCUMCISION EL CUIDADO DE SU HIJO POSTOPERATORIO

MIENTRAS TODAVIA ESTA EN EL HOSPITAL

1. Después de la cirugía que su hijo este completamente despierto será animado a beber líquidos claros.
2. El será dado de alta del hospital para la casa cuando este tolerando los fluidos sin vomitarlos. Náusea y vómitos son reacciones comunes después de la anestesia.
3. No se preocupe si ve una poca mancha de sangre en la punta del pene o la gasa.

DESPUES DE LA LLEGADA A CASA

VENDAJE/GASA

1. Su hijo podrá tener un vendaje envuelto en su pene. No se preocupe si ve una poca mancha de sangre en la gasa o la punta del pene.
2. Si la gasa no se ha caído en dos días postoperatorio entonces usted debe seguir las siguientes instrucciones para removerla. Es mejor remover la gasa durante la mañana:
 - A. Dese a su hijo Tylenol con codeína según la prescripción.
 - B. Cuarenta-Cinco minutos después de haberle dado la Tylenol con codeína, ponga su hijo en agua tibia en la bañera o ducha (sin jabón) para remojar la gasa por diez minutos. Usted quiere que la gasa este completamente remojada.
 - C. Quitele la gasa desenvolviendola o deslizandola.
 - D. El pene puede aparecer hinchado o rojo con algunas areas crudas y manchas de sangre. También puedes ver algunas areas con constra amarilla. Esto es de esperarse.
 - E. Aplique la pumada de antibiotico (Bacitracin, Neosporin) al pene y los puntos cuatro veces a día o después de cada cambio de pañales a los niños mas juvenes.

SI EL VENDAJE/GASA SE CAE

1. Su hijo puede tener un vendaje envuelto alrededor del pene. Esta se puede caer por si sola.
2. Se el vendaje se cae **NO TENGA PANICO**. El pene se vera hinchado y rojo con algunas areas crudas como tambien algunas manchas de sangre. Esto a de esperarse.
3. Si hay sangre aplique presión apretando el pene con una gasa entre el dedo pulgar y el dedo índice por cuatro minutos. Llame al médico si el sangramiento no se detiene después de aplicar presión.
4. Aplique la pumada de antibiotico (Bacitracin, Neosporin) al pene y los puntos cuatro veces al día. Puede poner una gasa sobre el pene para prevenir que haga contacto directo con la ropa interior o pañal.

DIETA

1. Puedes darle a su niño de comer jugos, gelatina y caldos claros por el primer día/tarde postoperatorio. Usted gradualmente puede comenzarle con comida solidas regular esa tarde.
2. Una dieta regular puede ser empezada la siguiente mañana.

MEDICACIONES

1. Usted puede darle a su hijo Tylenol (acetaminophen) para cualquier dolor o incomodidad.
2. Para dolor severo su médico puede haberle prescrito Tylenol con codeína.

ACTIVIDADES

1. Sillas de coche infante/niño con correa de seguridad en el sitio, cochecito y sillas elevadas pueden ser usadas inmediatamente.
2. Su niño puede pasear en el coche, caminar lo que pueda tolerar y subir y bajar escalones.
3. **EVITE** juguetes como (rebotadores, bicicletas, triciclos y caballos mecedores) por diez días.
4. **EVITE** actividades enérgicas incluyendo pero no limitado a deportes, correr, brincar, lucha libre y nadar.

BAÑÁNDOSE

1. Bañe su niño con usa esponja por los primeros dos días. (Vea las instrucciones debajo de GASA).
2. Baño regular puede empezar después de dos días a menos indicado por el médico. **PAÑALES** (si su niño está actualmente en pañales)
 1. Cambie el pañal de su niño más frecuentemente por la primera semana postoperatorio.

FIEBRE

1. Si su niño tiene una temperatura por debajo de 102F dele Tylenol como indicado.
2. Para una temperatura de 102F o más alta dele Tylenol y notifique su médico.

VISITA A LA OFICINA POSTOPERATORIO

1. Por favor haga una cita postoperatorio 2 semanas después de la fecha de la cirugía (a menos sea indicado de otra manera por su médico) llamando a la oficina más cercana durante las horas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.

St. Petersburg: 727-456-1055

Tampa: 813-874-7500

Para conseguir el médico después del horario regular o fines de semana el contestador de servicios te indicará a través de los números de teléfonos anteriormente mencionados arriba.